

國軍新竹地區醫院 泌尿外科

腹股溝疝氣修補手術

親愛的患者:

本人因為罹患腹股溝疝氣須接受疝氣修補手術，採傳統方式進行，術後將可減少因疝氣導致的不適，並可避免脫垂之腸道組織壞死。手術將推回脫垂之腹腔組織，切除疝氣囊，並視病況使用自體組織或人工網膜修補腹壁。術中可能發生之危險與併發症如下所述，均由主治醫師_____詳加解釋。

手術可能之併發症：參考 Campbell-Urology-11 版

1. 傷口疼痛 (發生率因人而異,但多數可以使用止痛劑緩解)。
2. 疝氣術後復發 (7%)，術後發生陰囊水腫 (0.5%)。
3. 傷口發炎，必須長期換藥，傷口清創，延遲縫合 (2%)。
4. 睪丸萎縮及下墜感 (1.8%)。
5. 出血合併血腫塊形成，少數病人需要再度止血或清除血腫塊 (1.3%)。
6. 腸子阻塞壞死，沾粘或破裂，須修補或切除重接 (0.7%)。
7. 膀胱破裂，須修補膀胱 (0.5%)。
8. 精索扭轉或斷裂 (0.3%)。

師

說明人: _____ 醫

日期: 公元 ____年__月__日

國軍新竹地區醫院 泌尿外科